

Guidelines on myocardial revascularization

The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)

Потенциальные показания для реваскуляризации ad hoc (сразу во время КАГ)

Ad hoc ЧКВ (сразу)
Гемодинамически нестабильные пациенты (включая кардиогенный шок)
Ответственный участок при ОКС с подъемом и без подъема ST
Стабильные пациенты с низким риском и одно- и двухсосудистым поражением (не включая проксимальный отдел ПМЖВ) с подходящей морфологией (ПКА, не устьевые ОА, средний или дистальный отдел ПМЖВ)
Не рестеноотические поражения
Ad hoc ЧКВ (сразу)
Гемодинамически нестабильные пациенты (включая кардиогенный шок)
Ответственный сегмент при ОКС с подъемом и без подъема ST
Стабильные пациенты с низким риском и одно- и двухсосудистым поражением (не включая проксимальный отдел ПМЖВ) и подходящая морфология (ПКА, не устьевые ОА, средний или дистальный отдел ПМЖВ)
Не рестеноотические поражения
ЧКВ после подготовки
Поражения с морфологией высокого риска
Наличие ХСН
Наличие ХПН (клиренс креатинина <60 ml/min), если потребуется количество контраста >4 мл/кг
Стабильные с многососудистым поражением с вовлечением ПМЖВ
Стабильные с устьевым или комплексным поражением проксимального отдела ПМЖВ
Любые клинические или ангиографические доказательства высокого перипроцедурного риска