

Guidelines on myocardial revascularization

The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)

Показания к реваскуляризации при стабильной стенокардии или безболевогой форме ишемии

Характер анатомии	Класс	Уровень
Для улучшения прогноза		
Ствол ЛКА >50% (*)	I	A
Проксимальный ПМЖВ >50% (*)	I	A
двухсосудистое или трехсосудистое с нарушенной функцией левого желудочка (*)	I	B
Доказана площадь ишемии (>10% ЛЖ)	I	B
Единственный оставшийся сосуд сужен >50% (*)	I	C
Однососудистое (кроме проксимального отдела ПМЖВ) и если площадь ишемии ≤ 10%	III	A
Для уменьшения симптомов		
Любой стеноз >50% со ограничивающей стенокардией или эквивалентом без ответа на оптимальную консервативную терапию	I	A
Одышка / ХСН при наличии >10% ишемизированной жизнеспособной области ЛЖ, кровоснабжающейся артерией суженной более 50%	IIa	B
Нет ограничивающих симптомов на оптимальной консервативной терапии	III	C

I – показано

IIa – больше показано, чем нет

IIb – менее показано

III – противопоказано!

* При наличии документированной ишемии или ФРК < 0,80 для стенозов 50-90%